

## Solitaires?

Pour ces abeilles : pas de ruche, pas de reine, pas d'ouvrières.

Une femelle pond environ 10 œufs dans un «tunnel» après avoir déposé un stock de pollen et de nectar récoltés sur le groupe de fleurs qui lui est propre.

La plupart d'entre elles font leur galerie dans la terre. On peut parfois observer plusieurs nids sur le même lieu. Il s'agit alors d'une bourgade.

Une fois le nid terminé, la femelle adulte meurt et sa descendance émergera un an plus tard.

[WWW.APICOOLO.ORG](http://WWW.APICOOLO.ORG)  
facebook : apicool  
contact@apicool.org  
06 03 56 68 90

Avec le soutien de la Fondation Léa Nature

## Abeille charpentière

*Xylocopa violacea*



La plus grosse des abeilles solitaires de France, noire aux ailes bleutées, est visible d'avril à la fin de l'été. Elle nidifie dans des galeries creusées dans du bois mort principalement.



Pois de senteur,  
Lavandes, Sauges



Bois mort

## Collète du lierre

*Colletes hederæ*



Cette abeille est visible en fin d'été liée de très près à la floraison du lierre sur lequel elle récolte le pollen pour ses larves. Elle nidifie dans le sol en bourgade.



Fleurs de lierre



Sols variés

**WOW!**  
apicool

≈ **1000**  
espèces d'abeilles en France.

**90%**  
sont solitaires

**6**abeilles  
solitaires  
de par chez nous

## Osmie cornue

*Osmia cornuta*



Une abeille printanière très velue et facile à observer car elle occupe très rapidement les gîtes à abeilles. Une tige creuse, une bûche percée et là voilà à s'affairer dans son nid qu'elle fermera avec de la terre.



Fruitiers, Saules,  
Muscaris, Romarin



Cavités  
diverses

## Andrène vagabonde

*Andrena vaga*



Noire, blanche, noire. Qui aurait dit une abeille ? Et qui plus est, qui nidifie dans des galeries creusées dans la terre (espèce dite terricole). Visible en mars/avril, souvent en bourgade.



Saules



Sols variés

## Andrène fauve

*Andrena fulva*



Entièrement rousse sur le dessus, entièrement noire sur le dessous, cette abeille solitaire terricole est visible au moment de la floraison des fleurs de groseilliers (mars à mai).



Fleurs de  
groseilliers



Sols variés

## Anthidie à manchettes

*Anthidium manicatum*



Cette abeille estivale est dite cotonnière car elle récolte des poils végétaux pour tapisser chaque cellule de son nid d'un duvet de laine.



Epières  
Lamiers



Cavités  
diverses